



Kleine Verletzungen – das 1x1 der Wundversorgung.

Kleine Wunden fachgerecht versorgen – so geht's Schritt für Schritt

Spülen Sie die Wunde mit lauwarmem Leitungswasser aus. Tragen Sie ein Wunddesinfektionsmittel auf und verschließen Sie die Wunde. Entweder mit einem Pflaster oder bei größeren Verletzungen mit einer beschichteten Wundauflage – so heilen die Wunden schneller und ohne Narben ab. Überprüfen Sie Ihren Tetanus-Impfschutz.

Achtung: Fühlt sich Ihre Haut warm an? Wird sie dick und rot? Sehen Sie tiefsitzende Splitter? War es eine Bisswunde von einem Tier? Dann konsultieren Sie einen Arzt. Übrigens, eine Sepsis (Blutvergiftung) zeigt sich u.a. durch Symptome wie Verwirrtheit, beschleunigte Atmung und Schüttelfrost. Bitte den Notarzt rufen!



Nasenspray-ratiopharm Erwachsene*

15 ml Spray. N2. Wirkstoff: Xylometazolin hydrochlorid 1 mg. Anwendungsgebiete: Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut bei Schnupfen, anfallsweise auftretendem Fließschnupfen (Rhinitis vasomotorica), allergischem Schnupfen (Rhinitis allergica).



Gelomyrtol forte*

20 Stück Kapseln. Wirkstoff: Myrtol. Anwendungsgebiete: Zur Schleimlösung und Erleichterung des Abhustens bei akuter und chronischer Bronchitis. Zur Schleimlösung bei Entzündungen der Nasennebenhöhlen (Singelfie)



Prospan Hustensaft*

100 ml Saft. Wirkstoff: Efeublätter-Trockenextrakt. Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden bei chronisch-entzündlichen Bronchialerkrankungen; akute Entzündungen der Atemwege mit der Begleiterscheinung Husten.



Soventol HydroCortisonacetat 0,5 %*

15 g Creme. Wirkstoff: Hydrocortisonacetat. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von allen Hauterkrankungen, die auf eine Behandlung mit Corticoiden ansprechen, wie z. B. entzündliche, allergische oder juckende Dermatosen.



^{*} Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. ** Unverbindliche Preisempfehlung der parmapharm Marktförderungs GmbH & Co. KG (www.gesundistbunt.de) für ihre Mitgliedsapotheken. *** Angabe unseres regulären Verkaufspreises.



1 Stück Gerät. Das Oberarm-Blutdruckmessgerät verfügt über ein großes, gut ablesbares Display. Die Blutdruckmessung erfolgt mit nur einem Knopf-





Voltaren Schmerzgel forte 23,2 mg/g Gel*

180 g Gel. Wirkstoff: Diclofenac, Diethylaminsalz. Anwendungsgebiete: Bei Schmerzen durch akute Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen infolge eines stumpfen Traumas. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden, alls in der Packungsbeilage angegeben.



Chlorhexamed FORTE alkoholfrei 0,2 %*

aponorm Basis Control Oberarm-BMG

300 ml Lösung. Wirkstoff: Chlorhexidinbis (D-gluconat). Anwendungsgebiete: Chlorhexamed FORTE alkoholfrei 0,2 % wird angewendet zur vorübergehenden unterstützenden Behandlung bei Zahnfleischentzündungen (Gingivitis) und nach parodontalchirurgischen Eingriffen.



Thomapyrin Classic*

20 Stück Tabletten. N2. Anwendungsgebiete: Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren bei akuten leichten bis mäßig starken Schmerzen. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden, als in der



Dolo-Dobendan 1,4 mg/10 mg*

36 Stück Lutschtabl. Wirkstoffe: Cetylpyridiniumchlorid, Benzocain. Anwendungsgebiete: Zur temporären unterstützenden Behandlung bei schmerzhaften Entzündungen der Mundschleimhaut und der Rachenschleimhaut. Enthält Sorbitol, Sucrose (Zucker) und Glucose.







* Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. ** Unverbindliche Preisempfehlung der parmapharm Marktförderungs GmbH & Co. KG (www.gesundistbunt.de) für ihre Mitgliedsapotheken. *** Angabe unseres regulären Verkaufspreises. Alle Preise in Euro, Irrtum vorbehalten. Abbildungen können vom Originalprodukt abweichen. Aktionen und Rabatte sind nicht kombinierbar.

Alte Apotheke

Apotheker Christian Zeidler e.K. Lohstr. 6a, 45711 Datteln

Fon: 0 23 63 / 21 23 Fax: 0 23 63 / 56 11 43

Tax. 0 20 00 / 00 11 40

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 08.00 - 18.30 Uhr Samstag: 08.30 - 13.00 Uhr

